

Beispiel Verdacht auf Autismus

Der 3-jährige Linus wird bei Verdacht auf eine Autismus-Spektrum-Störung zur weiteren Diagnostik stationär aufgenommen. Nach der Aufnahme in den Kindergarten war zunehmend aufgefallen, dass Linus keinen Kontakt zu anderen Kindern sucht. Die anfänglich starke Abwehr dagegen, in den Kindergarten zu gehen, hat sich nach den ersten Monaten etwas gelegt. Dennoch sitzt Linus meist alleine in einer Ecke und spielt mit einem Spielzeugauto. Seine Eltern berichten, dass seine Sprachentwicklung im Vergleich zu anderen Kindern verzögert ist. Erst mit 2 Jahren habe er Mama oder Papa sagen können. Auch im Kindergarten spricht Linus nur wenige Wörter. Auf eine klare Ansprache durch seine Eltern reagiert Linus, während er weitreichendere Kommunikationsversuche ignoriert.

Definition Frühkindlicher Autismus

Beim frühkindlichen Autismus kommt es zu einer tiefgreifenden Beeinträchtigung der Entwicklung des Kindes mit Beginn vor dem 3. Lebensjahr. Betroffen sind die verbale und nonverbale Kommunikation, die Kontaktaufnahme und zwischenmenschlichen Beziehungen. Das Verhalten des Kindes beschränkt sich auf wenige stereotype Reaktionsmuster, die sich immer wiederholen.

Ursachen

Die Ursachen des frühkindlichen Autismus sind nicht endgültig geklärt. Es konnte ausgeschlossen werden, dass der Autismus das Ergebnis falscher Erziehung ist. Forscher gehen von einer hirnrorganischen Ursache, einer gestörten Verbindung der Spiegelneurone sowie von einer genetischen Komponente aus.

Bei der Diagnostik mitwirken

Für die Diagnostik ist es wichtig, dass Pflegende sich sowohl mit dem Kind als auch mit den Eltern auseinandersetzen. Diese haben bereits viel mit ihrem Kind erlebt und können auch von Situationen außerhalb des Klinikalltags berichten. Diese Informationen sollten von Pflegenden sorgfältig dokumentiert und in Fallgesprächen eingebracht werden. Grundlage der Diagnostik sind Verhaltensbeobachtungen, Elterninterviews, Beurteilungsskalen und für das Alter geeignete Intelligenztests. Differenzialdiagnostisch wird zwischen frühkindlichem Autismus, Asperger-Syndrom und atypischem Autismus unterschieden. Ergänzend müssen Sinnesdefekte oder Intelligenzminde-rungen ausgeschlossen werden.



ARBEITSAUFTRAG

- 1 Bitte ergänzen Sie in der Grafik die Symptome des frühkindlichen Autismus.
- 2 Für ein Kind mit Autismus ist die Aufnahme in eine Klinik eine sehr belastende Situation. Welche Maßnahmen können Sie ergreifen, um die Aufnahme und den Aufenthalt für Kind und Eltern so angenehm wie möglich zu gestalten?
- 3 Wie sollten andere Kinder, zum Beispiel in der Klinik oder im Kindergarten, auf den Umgang mit einem autistischen Kind vorbereitet werden?
- 4 Wie unterscheidet sich die Symptomatik des Asperger-Syndroms von der des frühkindlichen Autismus?

Frühkindlicher Autismus.




Foto: Jonathan Stutz – stock.adobe.com

